



Hvepsestik

Sensommeren er højsæson for bier, hvepse og andre insekter. Det kan sikkert ikke undgås at børnene får et insektstik af og til. Bier og hvepse stikker hvis de føler sig angrebet, det kan være en fod, der træder – en hånd der tager omkring eller en mund som sluger. De har hver især forskellige typer brod, hvori der er gift.

Symptomer

- Normal lokalreaktion (barnet føler smerte, der er rødme og hævelse – ved stikstedet.)
- Generaliseret reaktion – ses fx ved allergi overfor hvepsestik (Barnet er dårligt, bleg, har påvirket almentilstand, vejrtrækningsproblemer, evt.udslæt over hele kroppen mm.

Hvor længe skal barnet passes hjemme?

Barnet kan komme i institution når det har det godt og kan deltage i de daglige aktiviteter.

Hvad kan du selv gøre?

Normal lokalreaktion

- Giften sidder i brodden, så væk med den hurtigst muligt. Man kan bruge en negl, eller pincet, skrabe med et kreditkort, kniv eller lign. Bagefter forsøg at suge noget af giften ud med en giftsuger (kan købes på apoteket). Rens såret med vand og sæbe. Smerten kan evt. lindres med iskoldt omslag, (isklumper eller lign pakket ind i håndklæde) eller lokalbedøvende creme fra apoteket. Kærlig omsorg, en historie, trøst mm.virker godt sammen med ovenstående.

Generaliseret reaktion

- Ved allergi over for hvepse/bistik – følg vejledning barnet har med sig fra egen læge. Giv medicin jfr egen læges ordination.

Kontakt 112 straks

Ved stik i munden eller svælget kan selv begrænset hævelse forårsage vejrtrækningsproblemer. Ring 112 med det samme.

Ved allergi overfor bi / hvepse stik, ring 112 når evt medicin der er ordineret til barnet er givet.

Klik her for at finde nummeret til lægevagten i region Syddanmark
www.laevagten.dk/kontakt-laevagten/region-syddanmark